

ВИЗИН® АЛЕРДЖИ — ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ КОНЪЮНКТИВИТЕ



ПОКАЗАН
В КАЧЕСТВЕ
МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ



Готов к началу действия
через **5 минут**¹



Помогает
до **12 часов**¹



Применение возможно
до **исчезновения
симптомов**²



Способен бороться
с зудом, покраснением,
отеком конъюнктивы
и век, слезотечением¹



**Не вызывает
сонливости**³
в отличие от некоторых
пероральных
антигистаминных
препаратов



**Взрослым
и детям
с 12 лет**¹

ПОРТФЕЛЬ ВИЗИН®

ВИЗИН® АЛЕРДЖИ
Аллергический конъюнктивит

ВИЗИН® КЛАССИЧЕСКИЙ
При отеке и покраснении глаз конъюнктивы



Капли



Капли



Ампулы для однократного
применения

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ВРАЧАМ, НЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

ООО «ДжейТНЛ» 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 3, ГК ООО «Джонсон & Джонсон», Май 2024.»
Визин® Алерджи РУ П N014198/01. Показания к применению: аллергический конъюнктивит. Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, ношение контактных линз, возраст до 12 лет, период кормления грудью. Побочные действия: Нарушения со стороны органа зрения, общие расстройства и нарушения в месте введения; очень редко — со стороны сердца, со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки, нервной системы.

1. Согласно инструкции по медицинскому применению Визин® Алерджи, капли глазные (П N014198/01).

2. Возможно применение до исчезновения симптомов. Длительность применения определяется врачом.

3. Согласно инструкции по медицинскому применению лобное действие «сонливости» отсутствует у Визин® Алерджи и присутствует у ряда пероральных антигистаминных (хлоропирамин, лоратадин, дезлоратадин и др.)

4. Детям младше 6 лет назначается под контролем врача.